

平成23年9月から平成24年2月までに重篤化回避出来た報告例(平成24年3月集計)

NO	患者情報					副作用の発見者	担当薬剤師	情報発端	薬学的管理の種類	
	性別	年齢	職業	飲酒/1日	喫煙/1日					
1	男性	70歳代	無職	0	0	薬剤師	薬剤管理指導	薬剤管理指導での患者の訴え・相談	副作用: 排尿障害	
	経過									
	発現年月日		発見年月日		経過内容・転帰・後遺症等					
	2011/8/31		2011/8/31		2011/7/13 初来局、ユリーフ服用中、トリプタノール20mg/1日開始 2011/8/10 トリプタノール40mg/1日へ増量 2011/8/31 薬剤管理指導時に尿が出にくいとの訴え有、DRへ報告→次回の診察で確認すること 2011/9/7 トリプタノール40mg継続処方、薬局にて再度症状確認様子見る 2011/9/8 本人さんが気になりだして再度受診トリプタノール中止炭酸リチウム処方 2011/9/10頃より症状改善傾向 →(転帰)軽快					
	被偽薬					併用薬				
	医薬品	1日量	投与経路	使用期間	使用目的	併用薬の薬歴	投与経路	1日量	使用期間	使用目的
トリプタノール10mg	20mg	経口	7/13~8/9	うつ病	ユリーフ	経口				
トリプタノール10mg	40mg	経口	8/10~9/7	うつ病	キプレス 葛根湯	経口 経口				
							7.5g	8/17~	頭痛	
【薬剤師のコメント】トリプタノール中止後3日目より、本人自覚症状改善しており、トリプタノールの副作用であった可能性は否定できない										
【情報提供により回避出来た事由】トリプタノールによる排尿障害の悪化を回避できた										