

平成25年3月から8月末までに重篤化回避出来た報告例(平成25年9月集計)

NO	患者情報								副作用の 発見者	担当薬剤師	情報発端	薬学的管理の種類	報告日
	性別	年齢	職業	飲酒/1日	喫煙/1日	妊娠	身長	体重					
1	女性	70歳							薬剤師	薬剤管理指導	薬剤管理指導時 での患者の訴え	副作用	2013/4/12
経過													
発現年月日			発見年月日			経過内容・転帰・後遺症等							
			H25.4.12			患者より十二指腸潰瘍であると聴取。本人によるとよくなっていると思うとの事だが、消化性潰瘍にセレコックスは禁忌の為、疑義照会。今回は痛みが強い為どうしても服用が必要との事。頓服の服用で必ず食後の服用する事。体調変化時は中止するように指導							
被偽薬						併用薬						原疾患・副作用歴・ 合併症・アレルギー	
医薬品	投与経路	1日量	使用期間	使用目的	併用薬の薬歴	投与経路	1日量	使用期間	使用目的				
セレコックス錠	内服	200mg	4/12から	痛みの緩和						十二指腸潰瘍			
【薬剤師のコメント】 実際にセレコックスによる消化性潰瘍が発生したわけではないが、元々十二指腸潰瘍があるため悪化の可能性が考えられる													
【情報提供により回避出来た事由】 消化性潰瘍が悪化する可能性も考慮し指導ができた。患者自身、悪化時の対応を理解できたと考える。													