

# プレアボイド報告(未然回避報告) 平成27年度前期8月締め報告分

(一社)久留米三井薬剤師会、医療連携委員会で行っていますプレアボイド報告事例収集も今年度で6年目を迎えました。前期(8月締切)集計が終了しましたので報告させていただきます。  
平成27年度前期は、未然回避報告12例、薬局ヒヤリ・ハット事例報告15例の報告があり、重篤化回避報告は今回ありませんでした。今回はヒヤリ・ハット事例が非常に多く、報告を6例に絞らせていただきました。  
久留米三井薬剤師会のホームページには全例掲載いたしますのでそちらで確認いただければ幸いです。

No	患者情報		報告に関する患者追加情報		担当薬剤師	情報発端	原因・疑義照会内容	情報提供前			情報提供後			情報提供後の変更事由	報告日
	性別	年齢	疾患・副作用情報	治療中の疾患				薬剤名	投与量	用法	薬剤名	投与量	用法		
1	女性	81歳		DM・HT	薬剤管理指導	お薬手帳	禁忌	クエチアピン12.5mg	1T	寝る前	レボトミン5mg	1T	寝る前	薬剤変更	2015/5/22
【報告者のコメント】お薬手帳にグリメクロ40mgの記録有。他医院にてDMフォロー中との事、Drへも手帳を提示したとの事だが、Drも見落とした様子。DM治療中である事疑義照会し、クエチアピン→レボトミンへ変更となる。															
2	女性	70代後年			薬剤管理指導	お薬手帳	重複投与	ベタニス50mg	1T	朝食後 U医院	ベタニス25mg S病院	2T	朝食後	薬剤中止	
【報告者のコメント】															
3	女性	70歳代		高血圧・糖尿病	処方箋監査	処方箋	併用未承認・副作用の可能性	グラクティブ50mg	1T	朝食後	ビクトーザ18mg	3ml	朝	薬剤中止	2015/8/19
【報告者のコメント】GLP-1アナログとDPP-4阻害剤は併用未承認であった為メーカーに問い合わせたところ、使用例はあるが、臨床試験は行っていないとの事だったので予期せぬ副作用が起こる可能性を危惧し疑義照会を行った。															
4	9	男児				医師からの相談 患者家族の訴え	併用注意	ミリンメルOD120ug	1錠	寝る前	休止			薬剤中止	2015/5/20
【報告者のコメント】整形外科Drより、小児科にて夜尿症治療の為、ミリンメル服用中の男児の手指関節痛へのNsaid投薬可否について問い合わせ有。ミリンメル添付文書・併用注意にNsaidとの併用による水貯留・浮腫発現リスク記載がある事を報告し、Nsaid少量短期間投与とし経過慎重観察となる。投薬時、母親に浮腫リスクについて説明したところ、小児科Drより「他病院より薬処方された場合はミリンメルの服用を中止して良い」との説明がなされていることが判明。小児科Dr及び母親は夜尿症が抑制されている為、ミリンメル離脱を考慮中であることを整形外科Drに報告し、ミリンメルを休止し、3日間Nsaidのみ服用して頂くことになった。															
5	40代	女性	ミノベンにためまい		調剤監査	患者の訴え・薬歴	その他の副作用	ミノマイシン700	2P	朝夕食後	ルリッド錠150mg	2錠	朝夕食後	薬剤変更	2015/3/14
【報告者のコメント】ミノマイシンが処方されていたが、以前ミノベンにためまいが起きたと副作用歴(薬歴・手帳)にあった為、本人へ確認後処方医へ疑義照会→ミノマイシン取り消しルリッドへ変更となる。															
6	70代	男性		2型糖尿病・心疾患・高血圧等	処方箋監査・調剤	処方箋・薬歴	禁忌・慎重投与	アズルバ20 アルダクソン25 ア-ガメトゼリー その他	1錠 1錠 3コ	朝食後 朝食後 毎食後	アズルバ20 ア-ガメトゼリー その他	1錠 3コ	朝食後 毎食後	薬剤中止	2015/8/28
【報告者のコメント】8/27にアズルバ20・アルダクソン25が含まれる定期処方あり。8/28にア-ガメトゼリー追加、K値を確認した所、6.2の為、高K血症に慎重投与のアズルバと禁忌のアルダクソンの服用についてDrに疑義照会→禁忌薬であるアルダクソンが中止となった。															
7	30代	男性			処方箋監査	薬歴	禁忌	タンニン酸アルブミン フェロミア750mg	3T 1T	毎食後 朝食後	キョウヘリン フェロミア750mg	3T 1T	毎食後 朝食後	薬剤変更	2015/9/5
【報告者のコメント】タンニン酸アルブミンとフェロミアが処方、禁忌の為処方医に問い合わせ、タンニン酸アルブミン中止キョウヘリンに変更になった。															
8	80代	女性		パーキンソン病	薬剤管理指導	お薬手帳	同種同効薬重複	プラザキサ75mg	1C	朝食後	処方なし			薬剤中止	2015/8/10
【報告者のコメント】他医院よりワーファリンとバイアスピリンの処方のある患者にプラザキサ処方あり、お薬手帳により確認出来た為疑義照会。お薬手帳の重要性を再確認した。															
9	80代	女性			薬剤管理指導	患者の訴え・相談	併用禁忌	ゼローダ錠 エンドキサン錠	1800mg 100mg	朝夕食直後 朝夕食直後	ゼローダ錠 エンドキサン錠	1800mg 100mg	朝夕食直後 朝夕食直後	投与方法変更	2015/7/8
【報告者のコメント】ティーエスワン配合OD錠からの切り替え、投薬時服用状況を確認したところ昨日まで服用していたとのこと。フッ化ビリミジン系抗悪性腫瘍の切り替えは7日間の休薬が必要の為疑義照会。2週間休薬してから服用するようにとの指示があったため、指導を行う。															
10	80代	女性		心疾患	薬剤管理指導	お薬手帳・薬歴	特殊な状況	アレロックOD5mg	2T	朝夕食後	アレロックOD5mg	1T	夕食後	薬剤減量	
【報告者のコメント】併用薬にワーファリン・フロセミド・重曹錠500・フェブリク20・ミカルディス・アテロック・クエン酸第一鉄・ケイキサレートDs・ネキシウムがあり腎機能低下が疑われた。薬歴より「透析までは行っていないが腎機能悪い」という患者の訴えがあったため、病院に腎機能を問い合わせたところCRE=2.59であった。これにより医師にアレロック減量を提案減量となる。															
11	50代	女性		関節リウマチ・高血圧	薬剤管理指導	お薬手帳	重要な基本的注意事項に該当	ベネット錠17.5mg	1T	起床時	ビビアント錠20mg	1T	朝食後	薬剤変更	
【報告者のコメント】他医院リウマチ科より転院受診。歯科治療中の為リセドロン酸17.5mgが中止されビビアント錠を継続服用していた。今回ベネット錠が処方され疑義照会後、ビビアント錠へ変更															
12	70代	女性		リウマチ	薬剤管理指導	お薬手帳		リウマトレックス	8mg	朝食後	リウマトレックス	8mg	朝食後	服薬指導	
【報告者のコメント】H27.6.10にリウマトレックス処方あり、併用薬情報で6.25よりファムビル6錠服用中、帯状疱疹が出ており医師には言っていない。疑義照会後リウマトレックス2週間分を中止するように指示あり、処方日数の変更となる。															