

# 平成24年度前期プレアボイド報告

No	患者情報		報告に関する患者追加情報		担当薬剤師	情報発端	原因・疑義照会内容	情報提供前			情報提供後			情報提供後の変更事由	報告日	
	性別	年齢	疾患・副作用情報	治療中の疾患				薬剤名	投与量	用法	薬剤名	投与量	用法			
1	50	女性			処方箋監査	お薬手帳・医薬品情報提供	同種同効薬重複	ナポールSR ロキソニンテープ	2p 21枚	朝夕食後 1回貼布	中止			薬剤中止	2012/6/27	
	【報告者のコメント】受付した処方内容内容はセレコックス100mg2T2xモーラス30だった。同効薬だった為疑義照会し、処方ではキャンセルになった。															
2	80	女性	腎機能障害あり		薬剤管理指導	お薬手帳	処方漏れ	なし				アーガメイトゼリー	2個	朝夕食後	薬剤追加	2012/8/11
	【報告者のコメント】他医院より転院の方で、お薬手帳によりアーガメイトゼリーの処方漏れが判明した。(他8種類処方有)															
3	80	女性			処方箋監査	薬歴	同種同効薬重複	エビスタ60mg	1T	朝食後	中止			薬剤中止	2012/8/16	
	【報告者のコメント】以前よりアクトネル2.5mgを服用中の患者に、他医院よりエビスタ60mgが追加になった。薬歴で確認後疑義照会したところ、エビスタ60mg中止となった。															
4	20	女性			薬剤管理指導	患者からの相談	併用注意	リーマス200mg セロクエル25mg ジェイゾロフト25mg	2錠 2錠 1錠	朝夕食後 朝食後 朝食後	リーマス200mg セロクエル25mg ジェイゾロフト25mg	2錠 2錠 1錠	朝夕食後 朝食後 朝食後	その他(サプリメント中止)	2012/8/22	
	【報告者のコメント】今回のケースは患者からの相談でセント・ジョーンズ・ワートの服用が発覚し、サプリメントを中止してもらうことで、セロトニン作用増強による副作用を回避できたが、サプリメントはお薬手帳でも確認できないことがほとんどの為、患者本人からの聞き取りが重要であると思った。															
5	70	女性		歯科技術者予定		患者からの訴え	使用上の注意	ボナロン35mg	1錠	起床時	中止			薬剤中止		
	【報告者のコメント】患者家族より、歯科受診予定ありとの事。電話にて歯科医師よりBP系の服用は避けてほしいとの要望を確認しボナロン錠の処方医師に疑義照会にて、お伝えし処方中止となる。															
6	78	女性				薬歴	併用禁忌	フロリドゲル経口	1本		中止					
	【報告者のコメント】FAXにて処方せん応需、薬歴確認中にハルシオン0.25mg服用歴記録確認、本人来局前の為、ハルシオンの処方元医院に問い合わせ、ハルシオン0.25mg処方確定。フロリドとの併用禁忌の為疑義照会にて処方中止															
7	86	女性				お薬手帳	重複投与	セレコックス100mg ケンタンODP				セレコックス100mg		薬剤中止		
	【報告者のコメント】ケンタン錠服用継続して腰痛が続いているので受診、ケンタン錠を中止してセレコックス100mgへ変更。ケンタンをODPより外して欲しいと病院より依頼、ケンタンの刻印を印刷し、薬情に貼り、お薬手帳にもケンタンを外してほしい事と処方中止してもらいたい旨を記載した。															
8	74	男性				患者の訴え	禁忌・重大な副作用	リリカカプセル75mg				ツムラ牛車腎気丸		薬剤変更→中止		
	【報告者のコメント】主応じ先よりリリカカプセル75mgが処方されていた。新患の為問診にて聞き取り中に患者よりリリカカプセルの副作用歴があり、その際、尿赤変、体重増加の症状が出現し中止になったことがあるという情報入手。以前調剤した薬局にも詳細な内容確認。リリカカプセルでの副作用確認、リリカは横紋融解症と体重増加の副作用の可能性が高く、再処方でも重篤な副作用が発現すると考え疑義照会しリリカ中止、ツムラ牛車腎気丸に変更になったが、他科で同薬剤処方の為、再度疑義照会し処方中止となる。															
9	60	男性		慢性腎不全(血液透析)	処方箋監査	薬歴	重大な副作用(現疾患：てんかん)	クラリチン10mg	1錠	寝る前	アレグラ60mg	2錠	朝夕食後	薬剤変更	2012/8/31	
	【報告者のコメント】アレグラ60mgは服用したことがあり、てんかん症状なかったため。変更															
10	10	女性	ゼラチンアレルギー		薬剤管理指導	患者からの訴え	禁忌・重大な副作用	SPTローチ				イソジンガーグル		薬剤変更	2012/8/31	
	【報告者のコメント】患者様よりゼラチンアレルギーであると言われた。SPTローチはゼラチンが含まれている為、疑義照会イソジンガーグルへ変更															
11	70	男性			薬剤管理指導	お薬手帳	同種同効薬重複	ランソプラゾールOD ネキシウム	15mg 20mg	朝食後 朝食後	ランソプラゾール ネキシウム	20mg	朝食後	薬剤中止		
	【報告者のコメント】胃潰瘍でネキシウムが処方されたが、お薬手帳を見るとランソプラゾールが処方されていた為DRIに疑義照会する。本人はタケプロンは胃薬と知っていたが、一般名で書かれている為、胃薬の認識がなかったよう。ランソプラゾールは服用しないように患者様に説明(一般名で今までの薬と認識されていないこともあるのでお薬手帳の確認が重要になってきている)															
12	69	女性			処方箋監査	医薬品情報提供	誤転記誤処方	セルベックスカプセル ゲンタシン軟膏	3c	毎食後	セフゾンカプセル100 ゲンタシン軟膏	3c	毎食後	薬剤変更	2012/8/20	
	【報告者のコメント】婦人科の処方で外用剤との組み合わせが不自然だったので、患者本人に診察時に胃薬を希望したことがないことを確認した上で、医師に疑義照会。電子カルテの選択ミスである事が判明															
13	82	男性			薬剤管理指導	お薬手帳	重複投与	ロキソニン錠60mg ムコスタ錠100mg	3錠 3錠	毎食後 毎食後	ロキソニン60mg	3錠	毎食後	薬剤中止	2012/7/12	
	【報告者のコメント】お薬手帳にて、他医院にて同じ薬剤が既に処方されていることを確認し、疑義照会の上、処方削除となる															
14	49	男性			薬剤管理指導	お薬手帳	同種同効薬重複	ランサップ400 タケプロンOD30mg	1シート 1錠	朝夕食後 朝食後	ランサップ400 タケプロンOD30mg	1シート 1錠	朝夕食後 朝食後	服薬指導	2012/7/19	
	【報告者のコメント】お薬手帳にて、他医院でH2受容拮抗薬「ファモチジン」が既に処方されていたことを確認し、医師に問い合わせ。除菌療法の薬剤を優先し、服用中は「ファモチジン」を中断することとし、その旨患者に説明															

No	患者情報		報告に関する患者追加情報		担当薬剤師	情報発端	原因・疑義照会内容	情報提供前			情報提供後			情報提供後の変更事由	報告日
	性別	年齢	疾患・副作用情報	治療中の疾患				薬剤名	投与量	用法	薬剤名	投与量	用法		
15	37	女性			処方箋監査	処方せん・薬歴	過量投与	プラザキサcp75mg ワソラン錠40mg	4c 3錠	朝夕食後 朝食後	プラザキサcp110mg ワソラン錠40mg	2c 3錠	朝夕食後 朝食後	薬剤減量・服薬指導	2012/5/10
	【報告者のコメント】プラザキサとワソランを同時に併用する場合は、プラザキサの減量考慮と、開始3日間はワソラン服用2時間以上前の服用となっているため、この2点について医師に問い合わせを行い、投与量の変更がなされた。服用方法についても添付文書通りの指示であることを確認し患者本人に説明														
16	60	女性				お薬手帳	同種同効薬重複	バリエット10mg ファモチジン10mg	1錠 1錠		バリエット10mg 中止	1錠		薬剤中止	2012/5/25
	【報告者のコメント】処方箋の発行元病院に最近まで入院されており、退院後初外来処方だったが、お薬手帳にて、かかりつけの近医で以前よりH2受容体拮抗剤を服用中であったことが判明、処方医に状況報告を行い、処方箋中のPPI製剤は継続、併用薬となるH2受容体拮抗剤を処方している病院に連絡を行い、当該薬剤を中止することになった。														
17	70	男性	ペニシリン・ケフラル		処方箋監査	薬歴	禁忌	パナン100mg	2錠	朝夕食後	クラチシッド200mg	2錠	朝夕食後	薬剤変更	2012/8/20
	【報告者のコメント】以前セフェム系抗生剤で薬疹が出ており、DRIに疑義照会、マクロライド系クラリシッドへ変更、クラリシッドは服用歴ある														
18	78	男性		糖尿病・逆流性食道炎・腰痛	薬剤管理指導	お薬手帳	重複投与	プロレナール5mg	3錠	毎食後	中止			薬剤中止	2012/
	【報告者のコメント】お薬手帳によりA病院からオパブロスモン錠が処方されていたこと確認。Bクリニックよりプロレナール錠が処方されたが、疑義照会後中止となる。重複投与回避														
19	50	女性		気管支喘息	薬剤管理指導	お薬手帳・薬歴	併用禁忌	インデラル			ワソラン			処方変更	
	【報告者のコメント】喘息治療中の患者に胸が苦しいとの訴えから他科からインデラルが処方。喘息には禁忌の薬剤なので疑義照会の結果ワソランに変更														